



SEMESTRAL

UNI

academiacesarvallejo.edu.pe

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

— ACADEMIA —
CÉSAR
VALLEJO

SEMESTRAL
UNI



Álgebra

Tema: Inecuaciones polinomiales II y fraccionaria

Docente: Gustavo Poma Quiroz

academiacesarvallejo.edu.pe

INECUACIÓN CUADRÁTICA

Su forma general es:

$$ax^2 + bx + c \gtrless 0 \quad a \neq 0$$

Ejemplos

- $5x^2 + 3x - 7 > 0$
- $x^2 - 10 \leq 0$

Resolución de la inecuación cuadrática

- 1) La inecuación cuadrática debe estar en su forma general y es conveniente que su coeficiente principal sea positivo ($a > 0$).
- 2) Calculamos el discriminante, según su resultado existen 3 casos.

Caso 3 $(\Delta < 0)$

Aplique el teorema de trinomio positivo y por simple inspección se obtiene el conjunto solución que puede ser $\mathbb{R}$ o $\emptyset$.

TEOREMA DEL TRINOMIO POSITIVO (TTP):

$$ax^2 + bx + c > 0; \forall x \in \mathbb{R} \leftrightarrow (a > 0 \wedge \Delta < 0)$$

Ejemplo

Sea

$$P_{(x)} = 3x^2 + 4x + 5$$

Hallemos Δ

$$\Delta = 4^2 - 4(3)(5)$$

Por el teorema del trinomio positivo

Como:

$$a = 3 > 0 \quad \wedge \quad \Delta = -44 < 0$$

$$\longrightarrow P_{(x)} = \underbrace{3x^2 + 4x + 5}_{+} > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

También tenga en cuenta lo siguiente:

$$\underbrace{3x^2 + 4x + 5}_{+} < 0 \longrightarrow CS = \phi$$

$$\underbrace{3x^2 + 4x + 5}_{+} \leq 0 \longrightarrow CS = \phi$$

$$\underbrace{3x^2 + 4x + 5}_{+} > 0 \longrightarrow CS = \mathbb{R}$$

$$\underbrace{3x^2 + 4x + 5}_{+} \geq 0 \longrightarrow CS = \mathbb{R}$$

Aplicación

Si $x^2 - rx + \frac{21}{4} > -r$; $\forall x \in \mathbb{R}$, halle la variación de r .

Resolución

TEOREMA DEL TRINOMIO NO NEGATIVO

$$ax^2 + bx + c \geq 0; \forall x \in \mathbb{R} \leftrightarrow (a > 0 \wedge \Delta \leq 0)$$

Aplicación

Determine la suma de valores enteros positivos de b si la inecuación cuadrática.

$$x^2 - bx + 4 \geq 0,$$

Se cumple para todo x que pertenece a los reales.

- A) 12 B) 15 C) 18 D) 21 E) 20

Resolución:

INECUACIÓN POLINOMIAL DE GRADO SUPERIOR

Son aquellas inecuaciones polinomiales consideradas de grado mayor o igual a 3.

Ejemplos

- $x^3 + 5x^2 - 10x + 4 \leq 0$
- $x^4 + x^3 - x + 3 \leq 2x + 1$

Su resolución

Se sugiere tratar de factorizar el polinomio, hasta obtener factores lineales o cuadráticos, de donde será fácil hallar las soluciones.

Ejercicio

Resolver la inecuación

$$x^3 + 3x^2 - 4x - 12 \leq 0$$

Resolución


$$\underbrace{x^3 + 3x^2}_{x^2(x+3)} - \underbrace{4x - 12}_{-4(x+3)} \leq 0$$

$$x^2(x+3) - 4(x+3) \leq 0$$

$$(x+3)(x^2 - 4) \leq 0$$

$$(x+3)(x-2)(x+2) \leq 0$$

Puntos críticos: $-3; 2; -2$



$$\therefore \text{CS} = \langle -\infty; -3] \cup [-2; 2]$$

Aplicación

Determine el menor valor entero de n para que el CS $\subset \mathbb{R}^+$

$$x^3 - 2nx^2 + 2n^2x - n^3 > 0$$

- A) 3 B) 2 C) 0 D) 1 E) -1

Resolución

TEOREMAS

Sea la inecuación polinomial, $P_{(x)} \gtrless 0$

Teorema 1

Si $P_{(x)}$ presenta un **factor positivo**, dicho factor se puede cancelar y no cambia el sentido de la desigualdad.

Ejemplos

Resuelva las siguientes inecuaciones

$$\begin{aligned} \bullet \quad & \underbrace{(x^2 + 4)}_{(+)}(x - 6) \leq 0 \\ & x - 6 \leq 0 \\ & x \leq 6 \\ & \therefore \text{CS} = \langle -\infty; 6] \end{aligned}$$


$$\bullet \quad (x^2 + 4x + 3) \underbrace{(x^2 + 2x + 5)}_{(+)} > 0$$

$\begin{array}{cc} x & \nearrow & 3 \\ x & \searrow & 1 \end{array}$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{coef. princ.} > 0 \\ \Delta < 0 \end{array} \right.$$

$$(x + 3)(x + 1) > 0$$

Puntos críticos: $-3; -1$



$$\therefore \text{CS} = \langle -\infty; -3 \rangle \cup \langle -1; +\infty \rangle$$

Teorema 2

Si $P_{(x)}$ presenta factores con **exponente IMPAR**, dicho exponente **se puede cancelar** y **no cambia el sentido** de la desigualdad.


Ejemplos

Resuelva las siguientes inecuaciones

- $(x - 7)^5(x + 2) \leq 0$

$$(x - 7)(x + 2) \leq 0$$

Puntos críticos: 7; -2




$$\therefore CS = [-2; 7]$$

- $(x + 6)^3(x - 4)x^7 > 0$

$$(x + 6)(x - 4)x > 0$$

Puntos críticos: -6; 4; 0



$$\therefore CS = \langle -6; 0 \rangle \cup \langle 4; +\infty \rangle$$

Teorema 3

Cuando $P(x)$ presenta factores con **exponente PAR**, se puede **cancelar dicho factor**, pero teniendo en cuenta lo siguiente:

Si la desigualdad es $\leq$ o $\geq$, se rescata la o las soluciones de los factores cancelados igualándolos esta a cero.

Ejemplos

Resuelva las siguientes inecuaciones

1) $(x-4)^2(x-1) \leq 0$

$$x-1 \leq 0 \quad \vee \quad x-4=0$$

$$x \leq 1 \quad \vee \quad x=4 \quad \therefore \text{CS} = \langle -\infty; 1] \cup \{4\}$$

2) $(x+3)^4(x-5)(x-8)^6 \geq 0$

$$x-5 \geq 0 \quad \vee \quad x+3=0 \quad \vee \quad x-8=0$$

$$x \geq 5 \quad \vee \quad x=-3 \quad \vee \quad x=8$$

$$\therefore \text{CS} = [5; +\infty) \cup \{-3\}$$

Ya se encuentra
en el CS

Si la desigualdad es $<$ o $>$, se rescata la o las restricciones obtenidas de los factores cancelados, indicando que estas deben ser diferente a cero.

Ejemplos

Resuelva las siguientes inecuaciones

1) $(x-5)^4(x-9) < 0$

$$x-9 < 0 \quad \wedge \quad x-5 \neq 0$$

$$x < 9 \quad \wedge \quad x \neq 5 \quad \therefore \text{CS} = \langle -\infty; 9 \rangle - \{5\}$$

2) $(x-6)^2(x-4)(x+1)^8 > 0$

$$x-4 > 0 \quad \wedge \quad x-6 \neq 0 \quad \wedge \quad x+1 \neq 0$$

$$x > 4 \quad \wedge \quad x \neq 6 \quad \wedge \quad x \neq -1$$

$$\therefore \text{CS} = \langle 4; +\infty \rangle - \{6\}$$

El CS no toma
este valor

INECUACIÓN FRACCIONARIA

Forma general

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0$$

Donde:

$P(x)$ y $Q(x)$ son polinomios

$$^{\circ}[Q(x)] \geq 1$$

Ejemplos

$$\bullet \frac{x+5}{x^2-2x-3} \geq 0$$

$$\bullet \frac{x^2+5x-6}{x^2-4} < 0$$

Teorema

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0 \leftrightarrow P(x) \cdot Q(x) \geq 0 \wedge Q(x) \neq 0$$

Resolución de una inecuación fraccionaria

- I. Garantizar la existencia de las fracciones y darle su forma general.
- II. Aplique el teorema.
- III. Reducir la inecuación obtenida usando la teoría de inecuaciones polinomiales para hallar su CS.

Aplicación

Resuelva la siguiente inecuación $\frac{x+3}{x-2} \leq \frac{x-2}{x+3}$

Resolución



GRACIAS

SÍGUENOS:   

academiacesarvallejo.edu.pe